

nativus

MEDICAL AESTHETICS

Falkoner Alle 68
2000 Frederiksberg

Patient information: Botulinum toksin til behandling af rynker

Hvad er botulinum toksin?

Botulinum toksin dæmper nervers indvirkning på andre celler, for eksempel muskelceller. Derved afslappes musklerne. I mere end 30 år har stoffet været brugt til kosmetiske behandlinger af blandt andet rynker i ansigtet. Botox® er handelsnavnet på et af de første præparater, men der findes nu flere forskellige på markedet.

Hvad gør behandlingen?

De såkaldte dynamiske rynker behandles, dvs. rynker der skyldes sammentrækninger i hudens muskulatur. Botulinum toksin afslapper de små muskler, der laver folder i huden, f.eks. i panden, omkring øjnene, ved munden eller på halsen, således at huden glattes ud. Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Følesansen i det behandlede område er uændret.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved behandlingen sprøjtes små mængder botulinum toksin ind forskellige steder ved, de fine ansigts- eller halsmuskler med en meget tynd nål.

Kan der forekomme uønskede virkninger?

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Det vil være lidt sværere at bevæge de muskler, der behandles, f.eks. i panden eller ved munden. Sjældent kan bevægemusklernes omkring munden lammes, så det bliver vanskeligt at fløjte eller drikke med sugerør. Bivirkninger vil alle svinde inden for 4 – 6 måneder

Ved behandling af panderynker lige over øjenbrynene, kan der yderst sjældent ske en forbigående lammelse af øjenlågmusklen, så øjenlåget ikke kan åbnes helt. Det vil oftest normaliseres i løbet af få uger. De sværeste tilfælde kan behandles med øjendråber. Intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavt-siddende øjenbryn.

Øvrige bivirkninger er sjældne: Infektion ved indstiksteder, hovedpine de første par dage og kortvarige lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner ses uhyre sjældent, og der er ingen kendte senfølger.

Akuttelefonen er altid åben: 40448815

Hvor længe går der, før jeg ser effekt?

Effekten indtræder efter 3-8 dage og toppe efter ca. 14 dage. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er asymmetri, kan en "touch up" behandling udføres efter 2 uger. Nogle skal have større mængder end andre for effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandling, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer botulinum toksin.

Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages? Virkningen forsvinder efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages

Hvad skal jeg selv gøre? Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere det behandlede område de første 4 timer, så stoffet ikke spredes til andre muskler. Stikhullerne lukker sig efter ca. 4 timer. Herefter kan make-up frit benyttes.

Du må ikke få botulinum toxin, hvis du er gravid, ammer, har allergi overfor botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinat, eller lider af sygdomme som myasteni eller Eaton-Lamberts sygdom. Oplys lægen om al medicin, du evt. indtager.

Information og samtykke

Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en bisidder.

Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandling.

Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal.

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til behandling og risici.

Navn / CPR nummer

Dato / Underskrift