

nativus

MEDICAL AESTHETICS

Falkoner Alle 68
2000 Frederiksberg

Patientinformation: Behandling af rynker og furer med ikke-permanente fillers

Hvad er ikke-permanente fillers? Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens konsistens (viskositet), og om der er andet end hyaluronsyre blandet i (f.eks. lokalbedøvelse). De tykkeste geler anvendes til behandling af kinder, de næsttykkeste til dybere furer og folder, f.eks. furen fra næsen til mundvigen. De lidt tyndere er velegnet til rynker f.eks. ved munden og i panden. Endelig findes der ikke-permanente fillers specielt til læberne.

Hvad gør behandlingen? Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden og huden bliver slappere. Når ikke-permanente fillers indsprøjtes i folder, udfyldes og glettes disse, fordi gelen giver ny volumen i huden og gør den mere spændstig. Da der er en løbende nedbrydning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.

Hvordan foregår behandlingen? Den klare gel indsprøjtes i huden med en tynd nål. Gelen indeholder lokalbedøvelse, hvilket tager det største ubehag forbundet med behandling. Behandlingen varer få minutter.

Fortryder man behandlingen kan filleren fjernes ved indsprøjtning af et enzym, der nedbryder den.

Kan der forekomme uønskede virkninger? Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder over et par dage. Make-up må først anvendes 12 timer efter behandlingen.

Infektion ses sjældent, men ved tegn på dette kontaktes læge, da antibiotikabehandling kan være nødvendig. Enkelte får et bumselignende udslæt i området og forkølelsessår (herpes) kan reaktiveres. I meget sjældne tilfælde kan rødmen i huden vare i flere måneder, eller der kan dannes vedvarende bindevævsknuder under og i selve huden. Der kan forekomme ujævnheder i deponeringen af gelen og evt. en overkorrektio n af rynken. Dette svinder af sig selv, i takt med at filleren nedbrydes. Filler er en meget sikker behandling med meget sjældne bivirkninger og senfølger. I sjældne tilfælde kan der opstå infektion og i yderst sjældne tilfælde kan der opstå knudedannelse og aflukning af blodkar,

som i yderste konsekvens kan føre til ødelagt hud og blindhed.
Akuttelefonen er altid åben: 40448815

Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Behandlingens effekt er afhængig af indsprøjtningsteknikken, men oftest er der straks god effekt med hel eller delvis udglatning af de behandlede rynker.

Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages? Det er meget individuelt, hvor lang tid behandlingen holder. Som regel holder resultatet fra 4-12 måneder.

Kombinationsbehandling med botulinum toxin kan give et mere holdbart resultat især i området mellem øjenbrynene. Det er her en fordel at behandles med botulinum toxin først og herefter filler.

To uger efter første behandling har filleren tilpasset sig i vævet, og så er det muligt at genbehandle, hvis man ønsker det.

Information og samtykke

Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en bisidder.

Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandling.

Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal.

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til behandling og risici.

Navn / CPR Nummer

Dato / Underskrift